



POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA OČKOVANIE PROTI TETANU A ZÁŠKRTU

Vážený pacient/Vážená pacientka,

do rúk sa Vám dostávajú informácie o povinnom očkovaní, na ktoré sa chystáte. Chceme, aby ste boli o tomto zákroku náležite informovaný, nie len ústne, ale aj v písomnej forme.

Tento dokument je vypracovaný v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

V prvom rade Vám chceme dať na vedomie, že Informovaný súhlas pre nás nie je iba Váš „podpis“, ale predstavuje vzájomnú, zrozumiteľnú komunikáciu medzi nami ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Vami ako pacientom. Prostredníctvom Informovaného súhlasu rozhodujete o svojom zdraví a určujete akými prostriedkami môžeme zasahovať do Vašej integrity. Naším cieľom je, aby zdravotná starostlivosť v každom ohľade rešpektovala Vaše osobnostné práva a v čo najmenšej miere do nich zasahovala.

Nasledujúce poučenie je napísané preto, aby Vám, na základe informácií v ňom obsiahnutých, umožnilo rozhodnúť sa, či súhlasíte takouto formou výkonu. Súčasťou je písomný informovaný súhlas, ktorý sa nachádza na konci tohto poučenia.

Keďže informovaný súhlas je právny dokument, žiadame Vás, aby ste si ho pozorne prečítali. Ak po prečítaní a porozumení všetkých informácií, vrátane možných komplikácií, súhlasíte s očkovaním proti chrípke, prosíme Vás, aby ste toto poučenie a informovaný súhlas podpísali.

V prípade, že niečomu nerozumiete, prípadne si želáte niečo prekonzultovať, nepodpisujte informovaný súhlas ihneď, ale až po konzultácii a vysvetlení zdravotníckym pracovníkom.

Tento dokument je rozdelený na dve časti:

1. Informácie týkajúce sa zdravotného výkonu (očkovanie proti tetanu a záškrtu)
2. Informované rozhodnutie pacienta

1. INFORMÁCIE O VÝKONE

Prosíme Vás, aby ste si nižšie uvedené informácie prečítali pozorne. Pokiaľ niečomu nerozumiete, alebo budete mať ďalšie otázky neváhajte sa s nimi na nás obrátiť. Cieľom Informácií nie je podať vyčerpávajúci vedecký/odborný opis zdravotného výkonu, ale zrozumiteľným spôsobom informovať o jeho základných znakoch, dôvode pre jeho realizáciu, rizikách, možných následkoch a alternatívnych postupoch. Pokiaľ budete mať záujem o hlbšie informácie, odporúčime Vám odbornú literatúru, v ktorej sa dozviete o tomto výkone viac.

A) ÚČEL OČKOVANIA - VAKCINÁCIE

Očkovanie (vakcinácia) je preventívnym opatrením, ktorého cieľom je aktívna ochrana pred vznikom prenosného, t.j. infekčného ochorenia. To je spôsobené mikroorganizmami - baktériami, vírusmi, plesňami alebo parazitmi, pričom niektoré z nich môžu spôsobiť závažné poškodenie zdravia až smrť. Do 19. storočia boli infekčné choroby najčastejšou príčinou úmrtia. Až očkovanie sa ukázalo ako zatiaľ najlepší spôsob, ako dosiahnuť zníženie počtu ochorení na prenosné infekčné choroby.

Pod termínom *očkovanie* rozumieme podanie očkovacej látky, t.j. vpravenie vakcinálnych antigénov do tela s cieľom vyvolať imunitnú reakciu organizmu. Po tom, čo sa očkovacia látka so svojou aktívnou zložkou dostane do organizmu, dostáva sa do lymfatickej uzliny, kde následne dochádza k vytvoreniu imunitnej odpovede, ktorá sa nazýva *imunizácia*. Výsledkom toho je vytvorenie špeciálnej imunity. Postup pri očkovaní, ako aj zloženie vakcíny, sa určuje na základe klinického skú-

šania. Klinické skúšanie je dlhodobý proces trvajúci aj niekoľko rokov (15 – 20 rokov), v ktorom sa testuje bezpečnosť a účinnosť vakcín. Z celkovej doby vývoja vakcíny odhadom až 70 % času pripadá na skúmanie jej bezpečnosti a efektívnosti. Výsledkom klinického skúšania očkovacích látok je určenie dávky, postup a rozvrh pri podaní každej vakcíny. Každá vakcína má príbalovú informáciu, ktorá obsahuje popis jej základných vlastností a pôsobenia.

Očkovanie má v populácii dve základné funkcie.

- a) Individuálna funkcia
- b) Kolektívna funkcia

Individuálna funkcia spočíva v ochrane konkrétneho zaočkovaného jednotlivca.

Kolektívna funkcia značí, že pri vysokej preočkovanosti populácie sa vytvára tzv. kolektívna imunita. Kolektívna imunita chráni nielen očkované, ale aj nezaočkované osoby. V závislosti od konkrétneho ochorenia sa vyžaduje preočkovanosť od 80 percent až k 95 percentám. Potvrdzuje sa, že zníženie preočkovanosti populácie, a to aj vtedy, ak sa choroba v populácii už neobjavuje, znamená zníženie kolektívnej ochrany a riziko znovu vypuknutia prenosných ochorení.

B) ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OCHORENÍ TETANUS

Tetanus je ochorenie s celosvetovým výskytom. V krajinách, kde zaočkovanosť obyvateľstva je nízka, sa tetanus vyskytuje často. Vďaka zavedenému pravidelnému očkovaniu proti tetanu výskyt ochorenia na Slovensku

Prehlasujem, že som bol poučený/bola poučená, a že rozumiem informáciám uvedeným v tomto dokumente.

Dňa:

Podpis:

významne poklesol a v súčasnosti sa ochorenie vyskytuje len zriedkavo.

Tetanus vyvoláva jed, ktorý produkuje baktéria *Clostridium tetani*. Do organizmu sa dostáva po poranení kože. Tento bacil sa dostáva do prostredia s výlučkami rôznych zvierat (kone, ošípané, ovce, hovädzí dobytok). Zostáva v pôde niekoľko rokov, kde je schopný prežiť vďaka tomu, že sa obalí na tzv. spóry. Po vniknutí do organizmu sa spóra premení za vhodných podmienok na životaschopný mikrób, pričom vhodné podmienky sú určené najmä hlbšími ranami, ktoré sa zatvoria a práve nedostatok kyslíka je pre množenie tohto mikroorganizmu veľmi priaznivé. Inkubačný čas, teda doba od vniknutia bacila do organizmu po prepuknutie prvých príznakov ochorenia trvá 7-14 dní. Ochorenie sa pri plnom vedomí chorého prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva (tzv. trizmus), šíjového svalstva a neskôr celého trupu. V ďalšom priebehu u chorého dochádza ku generalizácii kŕčov po rôznych vonkajších podnetoch. Ochorenia prebiehajú ťažko a približne 50% chorých umiera. Z človeka na človeka sa neprenáša.

Účinnou prevenciou je očkovanie proti tetanu, ktoré vzhľadom na charakter očkovacej látky treba opakovať aj v dospelosti. Súčasťou predchádzania ochorenia na tetanus je aj správne ošetrovanie rán. Preto je dôležité, aby ste poznali aspoň približný dátum posledného očkovania proti tetanu, pretože od tohto dátumu sa odvíja postup pri ošetrovaní poranení v závislosti od veľkosti a hĺbky poranenia, ako aj Vášho veku.

C) ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OCHORENÍ ZÁŠKRT

Posledný prípad ochorenia u nás bol zaznamenaný v r. 1980 a vďaka vysokej zaočkovanosti na Slovensku nedošlo k zavlečeniu ochorenia pri epidémii v okolitých krajinách. Ochorenie sa vyskytuje na celom svete a jeho výskyt je ovplyvnený očkovaním. Pokiaľ sa v krajinách darí udržať vysoké percento zaočkovanosti detskej populácie, ochorenie sa nevyskytuje. Akékoľvek zníženie zaočkovanosti má za následok nahromadenie vnímavých osôb a vzápätí aj výskyt ochorení.

Záškrt (diftéria) je akútne infekčné ochorenie. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose, občas na koži, a celkom zriedkavo na očnej spojovke. Ide o zápalový proces na slizniciach sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín, vysokou teplotou. Ochorenie má ťažký priebeh. V priebehu ochorenia sa poškodzujú nervy, ktoré spôsobia ochrnutie hlasiviek a prehltnutých svalov. Ochorenie máva často komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, ochrnutím mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením obličiek. Pred érou očkovania a liečby antibiotikami bolo ochorenie sprevádzané vysokou smrtnosťou. Ochorenie vyvoláva baktéria *Corynebacterium diphtheriae*. Inkubačný čas je 2-5 dní. Nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Prameňom nákazy je chorý človek.

Účinnou prevenciou je očkovanie proti záškrtu, ktoré vzhľadom na charakter očkovacej látky treba opakovať aj v dospelosti. V prípade výskytu ochorenia je potrebné podanie protizáškrtového séra, antibiotík, dlhodobý pokoj na lôžku, podporná liečba a diéta.

D) SPÔSOB VYKONANIA ZDRAVOTNÉHO VÝKONU A JEHO ROZSAH

Preto, aby bolo očkovanie účinné, je potrebné podať niekedy nie len jednu, ale aj viac dávok očkovacej látky. **Základné očkovanie** sa vykonáva ako súčasť očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým invazívnym infekciám a detskej obrne po ukončení 9. týždňa života dojčťa 3 dávkami. Prvá dávka sa podá v treťom mesiaci života dojčťa, druhá dávka o 2 mesiace a tretia dávka o 6 mesiacov po druhej dávke.

Preočkovanie proti záškrtu a tetanu spolu s očkovaním proti čiernemu kašľu, detskej obrne sa vykonáva v **6. a 13. roku života dieťaťa**.

Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou s vhodne upraveným tetanickým a difterickým toxoidom každých 15 rokov. Preočkovanie sa realizuje **jednou dávkou**, ak je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu **tromi dávkami sa vykoná len v prípade**, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Pri úrazoch, poraneniach alebo nehojácich sa ranách, kde hrozí nebezpečenstvo ochorenia tetanom, sa (podľa stavu preočkovanosť pacienta) podáva iba očkovacia látka proti tetanu alebo očkovacia látka proti tetanu v kombinácii s ľudským imunoglobulínom proti tetanu a liečba antibiotikami.

Vakcína sa aplikuje hlboko do svalu, u detí do jedného roka života do stehenného svalu, u starších detí a dospelých do ramenného svalu. Podanie vakcíny závisí od typu vakcíny a realizuje sa na základe oficiálneho odporúčania v príbalovom letáku vakcíny.

E) KONTRAINDIKÁCIE PRE VYKONANIE ZÁKROKU

Vhodnosť očkovania sa posudzuje individuálne podľa zdravotného stavu.

Očkovanie nie je možné vykonať, ak je prítomná:

- akútna infekcia alebo zotavovacia fáza po prekonanej chorobe
- závažná reakcia po predchádzajúcom podaní očkovacej látky
- anafylaktická reakcia (alergická reakcia) po podaní očkovacej látky v minulosti
- inkubačná doba infekčnej choroby (obdobie od vstupu nákazy do tela po jej prejavy) – výnimky postexpozíčné vakcinácie
- overená porucha imunitného systému
- podávanie liekov zasahujúcich do imunitného systému
- onkologické ochorenie
- gravidita
- aktuálne ťažko prebiehajúce alergické prejavy
- preventívne podanie očkovacej látky proti tetanu je kontraindikované v prípade degeneratívneho postihnutia nervovej sústavy
- kontraindikácia podľa príbalového letáku vakcíny

Očkovanie sa realizuje čo najskôr, keď pominú zdravotné dôvody na odklad očkovania.

V prípade poúrazovej profylaxie vzhľadom na riziko úmrtia na tetanus, žiadne kontraindikácie nie sú.

F) MOŽNÉ NEŽIADUCE ÚČINKY OČKOVANIA

Každý liek môže mať nežiaduce účinky. Nežiaduce účinky lieku, tak aj očkovacích látok (vakcín), sa zisťujú počas klinického skúšania. Nežiaduce účinky očkovacích látok sa striktne posudzujú v niekoľkých fázach (a to aj po uvedení na trh).

Aj po očkovaní sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, za ktoré sa považuje každý klinický príznak, ťažkosť, ochorenie, ktoré sa objaví u jedinca v období po očkovaní.

Môže ísť o prejavy vyvolané:

- stresovou reakciou na očkovanie
- imunitnou reakciou organizmu na vpichnutú látku
- alergickú reakciu na očkovaciu látku (zriedkavé)
- závažnejšie reakcie (extrémne zriedkavé).

Pre zdarné zvládnutie očkovania je preto dobré v pokoji sa pripraviť na možný výskyt, a to najmä bežných reakcií. Najčastejšie sú nežiaduce účinky spojené s tým, že po očkovaní t.j. vpichnutí očkovacej látky imunitný systém „pracuje“ a reaguje na očkovaciu látku.

a) Veľmi časté reakcie (viac ako 10 % prípadov)

Opuch, začervenanie, citlivosť kože – Miesto vpichu môže byť bolestivé na dotyk, začervenané, tvrdé s opuchom do 5 cm. Mierne príznaky nie je potrebné ošetrovať. Pri výraznejších opuchoch prikladajte studené obklady, potierajte octanovou masťou prípadne kontaktujte lekára, či je vhodné podávať lieky proti bolesti. **V prípade hnisaní v mieste vpichu alebo neustupujúceho opuchu a začervenania, vyhľadajte lekára.**

b) Časté nežiaduce účinky (v 1 – 10 % prípadov)

Nepokoj, podráždenosť – Príčinou zmien správania môžu byť pocity pri očkovaní samotnom, ktoré nemusia byť príjemné. Môže ísť aj o postresovú situáciu, ak bolo očkovanie traumatizujúce. Väčšina týchto prejavov odznie. **V prípade ale, že takýto stav trvá dlhšie ako 1 týždeň, vyhľadajte lekára.**

Poruchy spánku – Po očkovaní sa môžete cítiť unavenejší alebo naopak mať problémy so zaspávaním. **Lekára kontaktujte v prípade, ak sa tieto problémy vyskytujú dlhšie ako týždeň.**

Zvýšená teplota – Po očkovaní si kontrolujte telesnú teplotu. Ide o prirodzenú reakciu imunitného systému. Zvýšenú teplotu (do 38 stupňov Celzia) nie je potrebné zrážať. Zrážajte teplotu nad 38 stupňov Celzia (horúčku) pomocou liekov. Tie podávajte v pravidelných intervaloch. Pokiaľ teplota stále stúpa v intervale medzi podaním lieku na zníženie teploty, podajte iný liek. Ak teplota pri podávaní lieku neklesá, pristúpte k zábalom alebo znižovaniu teploty kúpeľom vo vlažnej vode. **V prípade, ak teplota vystúpi na viac ako 40 stupňov alebo horúčka pretrváva viac ako 24 hodín, vyhľadajte lekára.**

Nechutenstvo, zvracanie, hnačka – Ak sa vyskytnú riedka stolica, zvracanie alebo strata chuti do jedla, nepodávajte lieky na hnačku, ale dbajte na pitný režim,

aby nedošlo k dehydratácii, na ďalšom postupe sa dohodnite s ošetrovateľom lekárom. **V prípade, ak stav opakovaného vracania a riedkej stolice pretrváva, kontaktujte lekára.**

c) Menej časté nežiaduce účinky (pri 1 z tisíc až 10 tisíc očkovaných)

Teplota na 39 stupňov Celzia – Horúčku zrážame s pomocou liekov, ktoré je potrebné podávať v pravidelných intervaloch. **Ak teplota aj po podaní liekov prípadne zábalov trvá viac ako 24 hodín, vyhľadajte lekára.**

Opuchnuté uzliny – Sprievodným javom očkovania môže byť prechodné zväčšenie uzlín.

Bolesti svalov, kĺbov

d) Zriedkavé nežiaduce účinky (pri 1 zo 100 tisíc prípadov)

Alergická dermatitída – je taktiež alergickou reakciou, prejavujúcou sa na koži. Toto alergické zápalové kožné ochorenie je reakciou na vystavenie kože alergénu. Prejavy môžu byť rozmanité ako začervenanie, opuch, zvýšená, teplota kože alebo dôjde k celkovému výsevu vyrážky na koži. Pri ich výskyte kontaktujte ošetrovateľa lekára.

e) Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (menej ako 1 z milióna prípadov)

Anafylaktický šok – Ide o veľmi zriedkavú alergickú reakciu. Je to najťažšia forma alergie, búrlivá odpoveď organizmu na podanú látku, obvyčajne začína intenzívnym svrbením tela, sťaženým dýchaním, v priebehu niekoľkých sekúnd až minút môže dôjsť k rozvoju šoku a môže skončiť smrteľne. Táto reakcia sa prejavuje do hodiny, preto je dôležité zotrvať na pozorovaní cca 30 minút po očkovaní. Vo väčšine prípadov tieto reakcie vyvolávajú stabilizujúce a pomocné látky než účinná látka vakcíny.

Quinkeho opuch – rýchle vznikajúci opuch (do jednej hodiny), ktorý sa prejaví opuchom kože a slizníc, ohraničeným na niektorú časť tela, nebezpečný je opuch jazyka a hltanu, kedy hrozí udusenie.

Poruchy vedomia, kolapsový stav, slabosť, kŕče – v prípade výskytu je potrebné sledovanie stavu v nemocnici.

Zápal nervov (neuritída) – prejavuje sa zvýšenou alebo zníženou citlivosťou nervu a výraznou bolesťou.

Poruchy hybnosti – šetrenie končatiny z dôvodu bolesti po očkovaní je normálne. **Pri poruchách chôdze, ochabnutí končatín kontaktujte lekára.**

V prípade, že sa objavia nežiaduce účinky, informujte svojho lekára, ktorý podá lieky na zmiernenie nežiaducich účinkov, v prípade potreby odporučí hospitalizáciu a zváži, či ide o kontraindikáciu ďalšieho očkovania.

G) RIZIKÁ ODMIETNUTIA ZÁKROKU

Odmietnutie zákroku znamená, že osoba, ktorá nebude očkovaná, nie je chránená pred závažnými infekčnými ochoreniami, ktoré môžu spôsobiť nezvratné poškodenie zdravia až smrť. Rovnako v prípade svojho nakazenia môže významne ohroziť zdravie ešte nezačkovaných osôb.

H) ODPORÚČANIA PRED VÝKONOM

Pred podpisom tohto IS informujte lekára o

- a) alergii na lieky, očkovacie látky alebo potraviny
- b) nežiaducich účinkoch na predchádzajúce očkovanie
- c) ochoreniach, na ktoré sa dlhodobo liečite (neurologické, kardiologické, autoimunitné ochorenia, poruchy imunity a pod)
- d) aktuálne užívaných liekoch
- e) očkovaníach za posledné 3 mesiace.

I) ODPORÚČANIA PO VÝKONE

Očkovaný jedinec má mať minimálne 24 hodín telesné šetrenie (žiadne tréningy, športové aktivity a pod.), to isté platí pred samotným výkonom očkovania. Je potrebné kontrolovať telesnú teplotu, miesto vpichu. V prípade výskytu nežiaducich účinkov informujte svojho lekára.

Po očkovaní musí pacient zostať aspoň pol hodiny pod dohľadom lekára pre prípad vzniku alergickej reakcie

a s ňou spojenej anafylaktickej reakcie (vtedy je potrebné podať adrenalinovú injekciu).

IHNEĎ upozornite lekára, ak sa u Vás vyskytne po podaní lieku:

- dlhodobo zvýšená telesná teplota
- opuch, začervenanie, svrbenie, vyrážka, hnisanie v mieste vpichu, bolesť, krvácanie
- sťažené dýchanie, nevoľnosť, pokles či vzostup krvného tlaku
- apatia, ochabnutosť, kŕče

Ak sa vyskytne niektorá z týchto komplikácií, stav si môže vyžadovať podanie ďalšej liečby, prípadne hospitalizáciu.

ZLOŽENIE VAKCÍNY: Pozorne si prečítajte písomnú informáciu o zložení vakcíny predloženú lekárom. V prípade, ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať.

Vážený pacient/Vážená pacientka,

táto naša dôkladná a dúfame, že zrozumiteľná informácia isto nemôže byť úplne vyčerpávajúca a nemusí plne zodpovedať Vaše otázky. Pýtajte sa nás preto na všetko, čo Vás vo vzťahu k Vášmu zdravotnému stavu a odporúčanej zdravotnej starostlivosti zaujíma. **Prosím, pýtajte sa na všetko, čo sa Vám zdá dôležité!**

2. Informované rozhodnutie pacienta s očkovaním proti tetanu a záškrtu (ďalej ako „výkon“)

Pacient ¹:

Meno a priezvisko:

Rodné číslo:

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (tiež ako „ambulancia“) ²:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Tel./ E-mail: **dostupné na webe ambulancie**

1) VYHLÁSENIE PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU)

Ja ako pacient svojim podpisom **potvrdzujem, že som bol/a pred udelením informovaného súhlasu plne poučený/a** (zrozumiteľne, bez nátlaku a v dostatočnom časovom predstihu) v rozsahu uvedenom v písomnom vyhotovení poučenia a to najmä:

- o povahe môjho ochorenia, o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, ktorá mi má byť poskytnutá, vrátane diagnostických a liečebných postupov,
- o povahe navrhovaného výkonu, dôvodoch pre jeho vykonanie, ako aj o iných dostupných možnostiach jeho realizácie,
- o rizikách spojených s realizovaním výkonu, ako aj o riziku pre moje zdravie, ak navrhovaný výkon odmietnem,
- o tom ako mám postupovať po výkone a o ďalšom liečebnom režime,
- (v prípade ak je s výkonom spojené podanie lieku, či používanie lieku v domácom prostredí pacienta) o obsahu príbalového letáku lieku a o možných nežiadúcich účinkoch a podmienkach pre podanie/užívanie lieku,
- (v prípade ak je s výkonom spojené použitie zdravotníckej pomôcky) o spôsobe fungovania zdravotníckej pomôcky a možných rizikách spojených s jej použitím.

Svojím podpisom vyhlasujem, že:

- dokážem čítať a písať,
- ošetrojúci lekár mi okrem poučenia pred výkonom dal možnosť sa s poučením o výkone oboznámiť vopred v dostatočnom predstihu a to tak, že som mal možnosť si prečítať poučenie na webe ambulancie a tiež v tlačenej forme v čakárni ambulancie,
- pred výkonom som mal možnosť vysvetliť svoj zdravotný problém a mal som možnosť klásť doplňujúce otázky a na všetky mi bolo zrozumiteľne odpovedané,
- v danej veci nemám žiadne ďalšie otázky a bol mi poskytnutý dostatočný čas na rozhodnutie či výkon podstúpim,
- som nezatajil/a žiadne ochorenie, ktoré má súvis s výkonom, pre ktoré som sa v minulosti liečil/a, prípadne, ktoré mi bolo v minulosti diagnostikované. Beriem na vedomie, že zatajenie údajov o mojom zdravotnom stave môže mať priame alebo nepriame dôsledky na zvýšenie rizika spojeného s výkonom. Mojou anamnézou (súbor informácií o mojom zdravotnom stave), z ktorej lekár pred výkonom vychádza, sa považuje rozsah informácií v písomnej zdravotnej dokumentácii v ambulancii v čase podpisu tohto dokumentu,
- som rozumel otázkam, ktoré mi lekár pred výkonom položil,
- užívam len tieto lieky/výživové doplnky a bol som v posledných 6 mesiacoch očkovaný touto vakcínou (doplniť; pokiaľ ostane prázdne má sa za to, že pacient neoznámil lekárovi, že užíva nejaké lieky, alebo že bol očkovaný) ³:
- netrpím žiadnymi alergiami okrem týchto (doplniť; pokiaľ ostane prázdne má sa za to, že pacient neoznámil lekárovi, že trpí alergiami) ⁴:

- bol som poučený, že v prípade nezlepšenia môjho zdravotného stavu, alebo pri prejavení sa rizík spojených s výkonom mám bezodkladne kontaktovať ambulanciu,
- som oboznámený so všeobecnými zmluvnými podmienkami ambulancie, pravidlami spracovania mojich osobných údajov a právami s tým spojenými a všetkým týmto informáciám rozumiem,
- som poučený o cenníku poskytovateľa v prípade ak je s výkonom spojená aj platba z mojej strany, tak s touto platbou súhlasím,
- súčasťou formuláru poučenia a informovaného rozhodnutia je aj podpisový list týkajúci sa mojich budúcich rozhodnutí vo vzťahu k prípadnej budúcej potrebe opätovnej realizácie výkonu.

2) V PRÍPADE VÝKONU U NESPOSOBILÉHO PACIENTA

Vyhlásenie nespôsobilého pacienta: Týmto potvrdzujem, že mi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s ohľadom na môj vek a rozumovú vyspelosť vysvetlil všetky podstatné otázky týkajúce sa výkonu a vyjadrujem s ním:

(správne zakrúžkovať a nesprávne preškrtnúť) ⁵

• súhlas

• nesúhlas

Vyhlásenie zákonného zástupcu: Týmto vyhlasujem, že som zákonným zástupcom nespôsobilého pacienta a že neexistuje žiadna právna prekážka k tomu, aby som za nespôsobilého pacienta udelil informovaný súhlas k výkonu. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu poučený.

3) ROZHODNUTIE PACIENTA

Ja, **pacient** (správne zakrúžkovať a nesprávne preškrtnúť) ⁶

• Udeľujem informovaný súhlas

• Neudeľujem súhlas (s vedomím všetkých rizík uvedených v poučení)

ambulancii na realizovanie výkonu. V prípade udelenia súhlasu tento pokrýva aj všetky ďalšie nevyhnutné postupy/čiastkové zákroky, pokiaľ si ich vyžiada situácia počas realizovania výkonu a pokiaľ budú nevyhnutné pre zamedzenie vzniku škody na mojom zdraví.

Dátum (poučenia a rozhodnutia pacienta) ⁷:

Miesto podpisu: miesto prevádzky ambulancie

Podpis pacienta/zákonného zástupcu (potvrdzujem rozhodnutie vyznačené vyššie) ⁸

.....

Poučenie pred udelením súhlasu poskytol ⁹:

.....
Pečiatka poskytovateľa a podpis ošetrojúceho lekára

Pozn.: Kompletne písomné poučenie a toto informované rozhodnutie pacienta s výkonom bude založené do zdravotnej dokumentácie pacienta. V prípade ďalšej realizácie tohto istého výkonu, bude informované rozhodnutie pacienta s výkonom zaznamenané v Podpisovom liste pre zaznamenanie realizovania poučenia o výkone a o rozhodnutí pacienta, či výkon podstúpi, ktorý bude tiež založený v zdravotnej dokumentácii pacienta.